



Asociación Red de Investigadoras




6 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE

PACIENTES EN HEMODIÁLISIS Y COVID-19




1. ¿ESTE CORONAVIRUS AFECTA DE IGUAL FORMA A ENFERMOS RENALES?

Las personas en diálisis tienen más riesgo de contagiarse de COVID 19, esto debido a que la enfermedad renal inmunodeprime, es decir, provoca una disminución de las defensas ya que la mayoría de los pacientes tienen otras enfermedades como diabetes o hipertensión.




2. ¿DEBO TENER ALGUNA PRECAUCIÓN EXTRA SI SOY ENFERMO RENAL?

Al igual que todas las personas, usted debe mantener distancia física entre 1 y 2 metros, lavado de manos frecuentes y cuarentena. Además, debe salir de la casa solo para dializarse. En caso de sentirse enfermo, llame al centro de diálisis y avise para recibir instrucciones, evite usar el minibús del centro de diálisis. No deje de tomar sus medicamentos indicados, pídale a un familiar o amigo que se los retire en el Cefam o centro de salud.




3. ¿ESTE VIRUS TAMBIÉN AFECTA A LOS RIÑONES?

El virus afecta directamente los riñones al igual que los pulmones, ya que poseen unas sustancias que se unen directamente a la proteína que permite el ingreso del virus.




4. ¿SE PUEDE EXCRETAR O ELIMINAR VIRUS POR ORINA?

El virus se elimina solo por las deposiciones, no hay evidencia de que se elimine por la orina. Es muy importante el lavado de manos después de ir al baño, porque también hay riesgo de transmisión.




5. ¿SI ME TENGO QUE DIALIZAR, QUE PRECAUCIONES DEBO TENER?

- Evite usar el transporte compartido del centro de diálisis o transporte público.
- Use mascarilla quirúrgica si tiene que viajar en transporte compartido o colectivo.
- Mantenga 1 metro de distancia.
- Use alcohol gel al subir al furgón y al entrar a la sala de diálisis.
- Evite cambiar de turno de diálisis
- No ingiera alimentos mientras se dializa.




6. ¿QUÉ PASA CON MIS TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS O CITAS MÉDICAS?

- No puede suspender las diálisis.
- Sólo acuda a la consulta de salud si es urgente.
- Pida que le envíen los medicamentos a la casa.



Asociación Red de Investigadoras



MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO:

www.redinvestigadoras.cl

www.senferdialt.cl

Creado por:

Mirliana Ramírez y Carla Hernández

FUENTES:

Vega-Vega O, Arvizu-Hernández M, Domínguez-Cherit JG, Sierra-Madero J, Correa-Rotter R. Prevention and control of SARS-CoV-2 (Covid-19) coronavirus infection in hemodialysis units. Salud Publica Mex. 2020.

Ikizler, A. COVID-19 and Dialysis Units: What Do We Know Now and What Should We Do?AJKD Vol XX | Iss XX | Month 2020

The Renal Association (2020) Coronavirus (SARS-CoV-2) and its associated illness (COVID-19).

Wang, W. Xu, Y. Gao, R. Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens. JAMA Published online March 11, 2020.

